



PRESS RELEASE

平成27年12月7日

報道機関各位

長崎大学
岡山大学

結核ワクチン BCG の遺伝的安定性を実証

長崎大学熱帯医学研究所国際保健学分野の和田崇之助教、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科（歯）口腔微生物学分野の大原直也教授、京都大学、神戸市環境保健研究所、結核研究所、日本ビーシージー製造株式会社の共同研究グループは、結核に対する BCG ワクチン計 7 ロットのゲノム解析を実施。培養による新たな変異の混在が少なく、安定性が良いことを確認しました。本研究成果は 12 月 4 日、英国のオンライン科学雑誌「*Scientific Reports*」に掲載されました。

結核に対する BCG ワクチンは、生菌ワクチンで、長年継代培養され、また市販ロットを作製する際にも継代培養されます。これまで、変異を生じた菌が多く含まれる懸念がありましたが、日本の BCG ワクチンの中に変異を持った菌がどれだけ存在するかはわかつていませんでした。本研究成果は日本の BCG ワクチンが安定であることを示し、安全性の担保につながるものです。

<業績>

長崎大学、岡山大学らの共同研究グループは、結核に対するワクチンである BCG ワクチンの新旧シードロット 2 種類、それから継代培養・製造された市販ロット 3 種類、日本のシードロットに由来する海外の市販ロット 2 種類の計 7 ロットのそれぞれに含まれる全遺伝情報を解析。大きな変異として 7 種類の点変異が検出されたが、これらは新規の変異ではないことが明らかになりました。


本解析により、日本のシードロットとそれに由来する国内外の市販ロットがいずれも新規変異の混在が少なく、安定性が良いことが確認されました。また今回用いた遺伝情報の解析手法が極めて精度の良い方法であることが検証されました。

<背景>

BCG ワクチンは、人類に対して最も数多く接種されたワクチンです。1921 年にフランス・パストール研究所の Calmette 博士と Guérin 博士が、ウシ型結核菌の培養を繰り返すことにより弱毒化して作製。日本には 1924 年に志賀潔博士によって持ち込まれ、その後 1961 年に最初のシードロット（実際に接種する市販ロットの種となるもの）が作製されました。現在は 2 代目のシードロットが使用されています。BCG ワクチンは長年の継代培養の繰り返しによる作製で、変異を生じた菌が含まれるという懸念が持たれています。実際、各国の BCG ワクチンには異なる部分（変異）があること、日本の BCG ワクチンには少なくとも 2 種類のタイプが存在することが知られています。本研究グループは、BCG ワクチンの安全性を担保するためには、日本の BCG ワクチンの中に変異を持った菌がどれだけ存在するかを明らかにする必要があると考え、全遺伝情報の解析を実施しました。

PRESS RELEASE

図 今回解析に用いたロット



<原論文情報>

論 文 Deep sequencing analysis of the heterogeneity of seed and commercial lots of the bacillus Calmette-Guérin (BCG) tuberculosis vaccine substrain Tokyo-172.

著 者 Wada T, Maruyama F, Iwamoto T, Maeda S, Yamamoto T, Nakagawa I, Yamamoto S, Ohara N.

掲 載 誌 *Scientific Reports*

D O I 10.1038/srep17827

発表論文はこちらからご確認いただけます。

<http://www.nature.com/articles/srep17827>

<お問い合わせ>

長崎大学熱帯医学研究所

国際保健学分野 助教 和田 崇之

(電話番号) 095-819-7869

(メール) twada@nagasaki-u.ac.jp

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科（歯）

口腔微生物学分野 教授 大原 直也

(電話番号) 086-235-6655

(メール) oharan@md.okayama-u.ac.jp